

# Fourmidor®

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. • Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και ύστερα πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

**ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

## ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το Fourmidor® δρα δια επαφής και μέσω κατάποσης. Τα μυρμηγκία έλκονται από το gel, το προσλαμβάνουν δια της κατάποσης και το μεταφέρουν στη φωλιά τους για να ταΐσουν τους απογόνους. Τα μυρμηγκία θα πεθάνουν αργότερα στη φωλιά τους, μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

## ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμόστε 1 σταγόνα 3 – 4 mm (περίπου 0,03 γραμμάρια) ανά 30 εκατοστά πάνω στις γραμμές στις οποίες κινούνται τα μυρμηγκία, εντός και εκτός κτιρίων. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή να ελέγχονται μετά από 1 με 2 εβδομάδες ή και νωρίτερα. Εάν το gel έχει καταναλωθεί πλήρως και υπάρχει ακόμη δραστηριότητα των μυρμηγκιών στην περιοχή, θα πρέπει να γίνεται επανάληψη της εφαρμογής.

**Χρήση εκτός κτιρίων:** Οι φωλιές των μαύρων μυρμηγκιών στον κήπο συχνά βρίσκονται κάτω από μονοπάτια, πλάκες ή τοίχους, που παρέχουν ειδική προστασία για την αποικία. Τα κίτρινα μυρμηγκία πάντα ζουν έξω και κινούνται κατά μήκος ρωγμών στους τοίχους και στα μονοπάτια της αυλής για να είναι προστατευμένα. Το Fourmidor® είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται στη γραμμή/μονοπάτι που ακολουθούν τα μυρμηγκία.

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Για την καταπολέμηση των **Μυρμηγκιών** εντός και εκτός κατοικιών και άλλων κτιρίων. Δόση: 1 σταγόνα 3–4mm (περίπου 0,03γραμ.) ανά 30 cm, επάνω στις γραμμές που κινούνται τα μυρμηγκία. Χρόνος εφαρμογής: από τη στιγμή της εμφάνισης τους.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν ή καθαρίζονται συχνά.
- Μην ψεκάζετε κανένα άλλο εντομοκτόνο στα σημεία που εφαρμόζεται το Fourmidor και μην το εφαρμόζετε εάν ήδη έχουν ψεκαστεί με άλλα εντομοκτόνα πρόσφατα, γιατί μπορεί να επηρεάσει την ελκυστικότητα του gel.
- Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος, η περιοχή στην οποία κινούνται τα μυρμηγκία, θα πρέπει να καθαρίζεται από οποιαδήποτε εναλλακτική τροφή, πριν την εφαρμογή του.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

## ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο δροσερό και ξηρό, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:** Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και φαρμακεία.



® Σήμα κατατεθέν BASF

81080516 GR 1093

