



309103-00

**Ingelvac
CircoFLEX®**



**Boehringer
Ingelheim**

Main panel:
tradename: 21 pt.
text: 9 pt.

ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Germany

Δραστική ουσία

Κάθε δόση του 1 ml του αδρανοποιημένου εμβολίου περιέχει:
Πρωτεΐνη ORF2 του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου:
ελάχιστη ΣΙ* 1,0, μέγιστη ΣΙ* 3,75
*Σχετική Ισχύς (δοκιμή ELISA) από σύγκριση με ένα εμβόλιο αναφοράς
Ανοσοενισχυτικό: Carbomer

Ενδείξεις

Ανοσοποίηση των χοίρων ηλικίας άνω των 2 εβδομάδων κατά του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου (PCV2), για τον περιορισμό της θνησιμότητας, των κλινικών συμπτωμάτων - συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας βάρους - και των αλλοιώσεων των λεμφοειδών ιστών που σχετίζονται με τη νόσο από κυκλοϊό του χοίρου (NKX). Επιπρόσθετα, ο εμβολιασμός έχει αποδειχθεί ότι περιορίζει τη ρινική απέκκριση, το ιικό φορτίο στο αίμα και τους λεμφοειδείς ιστούς και τη διάρκεια της ιαμίας.
Εγκατάσταση ανοσίας: 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό
Διάρκεια ανοσίας: το ελάχιστο 17 εβδομάδες.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Κατά την ημέρα του εμβολιασμού, πολύ συχνά επισυμβαίνει ελαφρά και παροδική υπερθερμία.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

Είδη ζώων

Χοίροι (από την ηλικία των 2 εβδομάδων).

Δοσολογία για κάθε είδος, οδός και μέθοδος χορήγησης

Εφάπαξ ενδομυϊκή έγχυση (IM) μιας δόσης (1 ml) σε χοίρους, ασχέτως σωματικού βάρους.

Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση

Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση.
Χρησιμοποιείστε συσκευές εμβολιασμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Αποφύγετε την πολλαπλή διάτρηση του φιαλιδίου.

Χρόνος αναμονής

Μηδέν ημέρες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Φυλάσσετε και μεταφέρετε σε ψυγείο (2°C - 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως. Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στη φιάλη.

Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμα.

Ειδικές προειδοποιήσεις

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Αποφύγετε την επιμόλυνση κατά τη χρήση.

Θα πρέπει να εμβολιάζονται μόνο κλινικά υγιή ζώα.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία

Δεν συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Ασυμβατότητες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, σχετικά με τη συμβατότητα αυτού του εμβολίου με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο. για το λόγο αυτό, συνιστάται να μη χορηγούνται άλλα εμβόλια την ίδια ημέρα ή σε διαφορετικό χρόνο. Να μην αναμιγνύεται με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο ή ανοσολογικό προϊόν.

Απόρριψη αχρησιμοποίητου προϊόντος ή υπολειμμάτων, εάν υπάρχουν

Τα υπολείμματα, θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών χρήσης

02.2008

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)
<http://www.emea.europa.eu>

Άλλες πληροφορίες

Το εμβόλιο, προορίζεται να διεγείρει την ανάπτυξη ενεργητικής ανοσολογικής απάντησης κατά του κυκλοϊού τύπου 2 του χοίρου.

Φιάλη των 10 ml (10 δόσεις), 50 ml (50 δόσεις), 100 ml (100 δόσεις) ή 250 ml (250 δόσεις), συσκευασμένη ατομικά σε χάρτινο κουτί.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν αυτό, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Ελλάδα/Κύπρος

Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim/Rhein

Tel: +49- 6132 77 2645