



Gebrauchsinformation

TRIXIE Floh- und Zeckenband

für Hunde großer Rassen,
6,3 g/Halsband
Dimpylat

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist: Virbac, 1ère avenue – 2065m – LID, F-06516 Carros

Mitvertrieb: TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, Industriestraße 32, D-24963 Tarp

Bezeichnung des Tierarzneimittels: TRIXIE Floh- und Zeckenband für Hunde großer Rassen, 6,3 g/Halsband, Dimpylat

Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile: 1 Halsband à 42 g enthält:

Wirkstoff(e): Dimpylat (0,0'-Diethyl-O''-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl)-thiophosphat) 6,3 g
Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist: Butylhydroxytoluol 0,0504 g, Kohlenschwarz (E153), Schwarzes Halsband

Anwendungsgebiet(e):

Zur äußerlichen Anwendung bei Befall von Hunden mit Flöhen (Hundefloh, *Ctenocephalides canis*; Katzenfloh, *Ctenocephalides felis*) und Zecken (braune Hundezecke, *Rhipicephalus sanguineus*, Schildzecke, *Ixodes ricinus*). Hinweis: Das Anlegen des Halsbandes führt zu einer deutlichen Reduktion des Befalls der Tiere mit Zecken bzw. Flöhen, eine vollständige Elimination der Parasiten kann jedoch nicht gewährleistet werden.

Gegenanzeigen:

Nicht bei kranken und rekonvaleszenten Tieren anwenden.
Nicht bei Tieren mit großflächigen Hautläsionen anwenden.
Nicht gleichzeitig mit anderen Ungeziefermitteln anwenden.
Nicht bei trächtigen oder laktierenden Hündinnen anwenden.
Nicht bei Tieren anwenden, die jünger als 6 Monate sind.
Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Nebenwirkungen:

Allergische Hauterkrankungen sind äußerst selten.
Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart(en): Hund

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Die versiegelte Packung ist erst unmittelbar vor dem Gebrauch zu öffnen.
Das Halsband wird dem Tier locker am Hals befestigt; Überlängen werden abgeschnitten.
Das Halsband wird am Tier (Hund) für ca. 4 Monate gegen Zecken und für ca. 6 Monate gegen Flöhe befestigt.

Hinweise für die richtige Anwendung:

Vor dem Baden ist das Halsband abzunehmen, da der Wirkstoff für Fische und andere im Wasser lebende Organismen giftig ist.

Wartezeit: Entfällt.

Besondere Lagerungshinweise: Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Besondere Vorsicht sollte erfolgen bei der Anwendung des Halsbandes bei Tieren mit Herzinsuffizienz, Bronchospasmus, Krampfneigung, Leber- oder Nierenerkrankungen. Tiere mit einem struppigen, verfilzten oder verfetteten Haarkleid sollten vor dem Anlegen des Halsbandes gebadet oder shampooiniert werden. Bei Kontakt des Halsbandes mit Wasser kann ein Wirkungsverlust auftreten. Der korrekte Sitz des Halsbandes ist regelmäßig zu kontrollieren.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Das Halsband ist für den äußerlichen Gebrauch zur Floh- und Zeckenvernichtung bestimmt und darf

weder von Tieren noch von Menschen innerlich aufgenommen werden. Tiere mit TRIXIE Floh- und Zeckenband für Hunde großer Rassen 6,3 g sind von Kleinkindern und Säuglingen fernzuhalten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Nicht gleichzeitig mit anderen Hemmstoffen der Cholinesterasen (z. B. Carbamate), Parasympathomimetika (z.B. Pyrantel, Levamisol) oder Neuroleptika der Phenothiazinreihe anwenden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel):

Durch eine zufällige orale Aufnahme zu Überdosierungen kommen. Gegenmaßnahme ist eine Behandlung mit Atropin.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich:

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden. Halsbänder dürfen nicht in Gewässer gelangen, da der Wirkstoff für Fische und andere im Wasser lebende Organismen giftig ist.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage März 2013

Weitere Angaben

Packungsgrößen: Packung mit 1 Halsband zu 42 g.

Packung mit 12 Halsbändern zu 42 g.

Packung mit 20 Halsbändern zu 42 g.

Packung mit 24 Halsbändern zu 42 g.

Möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen gleichzeitig in Verkehr gebracht.



Ungezieferpräparate

Die TRIXIE-Präparate sind speziell zur Vernichtung von Kaltblütern wie Flöhen, Läusen, Zecken und anderen Parasiten konzipiert, um Mensch und Tier sowie deren Umgebung vor Ungeziefer zu schützen.

Die Bekämpfung von Ungeziefer und der Schutz vor Neubefall umfassen drei wichtige Schritte:

1. Behandlung des Tieres

Bei Flohbefall sollte eine umgehende Behandlung des Tieres erfolgen, um es so schnell wie möglich von den lästigen Parasiten zu befreien. Das ist wichtig für das Wohlbefinden Ihres Tieres und vermeidet weitere Nebenwirkungen durch Flohbisse. Das TRIXIE-Sortiment umfasst verschiedene Shampoos, Puder und Sprays zur Ungezieferbekämpfung direkt am Tier.

2. Behandlung der Umgebung

Die Behandlung des Tieres bleibt ohne Effekt, wenn man das Ungeziefer nicht wirksam an seinen Brutstätten bekämpft. Flöhe legen ihre Eier nicht nur am Tier ab, sondern vor allem in der Umgebung, z.B. an Schlaf- und Liegeplätzen.

TRIXIE bietet verschiedene Umgebungssprays an. Damit können Sie gezielt betroffene Bereiche in Haus und Wohnung behandeln. Umgebungssprays gibt es auch mit Langzeitschutz. Der zusätzliche Wachstumshemmer bewirkt das Absterben der Larven und schützt so für 6 Monate vor Neubefall. Beliebt ist auch der Fogger, welcher sich zur großflächigen Behandlung eignet. Die Flasche entleert sich innerhalb von Minuten und verteilt den Sprühnebel im gesamten Raum.

3. Vorbeugemaßnahmen

Zuverlässigen Langzeitschutz vor Flöhen, Zecken und anderem Ungeziefer bieten die zahlreichen TRIXIE Ungezieferhalsbänder. Sie wirken am Tier und sind durch ihre lange Wirksamkeit besonders zur Prophylaxe gegen Neubefall geeignet. Um einen effektiven Schutz zu erreichen, muss das TRIXIE Ungezieferhalsband ständig getragen werden.

Eine natürliche Alternative zu chemisch-pharmazeutischen Produkten ist das Spot-On Zeckenmittel aus dem Hause TRIXIE. Die Tropfen werden an Nacken und Rutenansatz aufgetragen. Sie machen sich die natürliche, repellierende Wirkung des hochwertigen Margosa-Extraktes zunutze und bieten dadurch effektiven Schutz vor Zecken, Flöhen und Milben.